処方箋医薬品

抗甲状腺剤
日本薬局方　チアマゾール錠

メルカゾール®錠2.5mg
メルカゾール®錠5mg

処方箋医薬品

抗甲状腺剤
チアマゾール注

メルカゾール®注10mg

― 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。―

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知により、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.337 に掲載される予定です。

2025 年 6 月

あすか製薬株式会社

改訂内容（＿＿＿：改訂箇所）＜メルカゾール錠2.5mg・5mg、メルカゾール注10mg＞

改　訂　後	改　訂　前
11. 副作用 省略 11.1.1～11.1.9 省略 **11.1.10 急性膵炎**（頻度不明） 上腹部痛、背部痛、発熱、嘔吐等の症状、膵酵素異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	**11. 副作用** 省略 11.1.1～11.1.9 省略 ← 新規

次ページに、報告された「急性膵炎」の症例概要を紹介いたします。

～最新の電子添文はこちらから～

メルカゾール®錠2.5mg
メルカゾール®錠5mg
(01)04987123514514

メルカゾール®注10mg
(01)04987123512534

＜メルカゾール注10mg投与症例＞

No.	患　者		1日投与量 投与期間	副作用 経過及び処置
	性・ 年齢	投与目的 （合併症）		
1	男 50代	甲状腺クリーゼ、バセドウ病 （高血圧）	30mg 2日間 ↓ 15mg 1日間 ↓ 30mg 4日間	**急性膵炎** 投与4日前　39℃の発熱あり、救急要請し近医受診。COVID-19、インフルエンザ陰性を確認し帰宅。 投与1日前　発熱持続のため近医受診、対症療法のみで帰宅。 嘔吐、下痢が増悪。 投与開始日　近医受診。不穏、発熱継続、頻脈あり、甲状腺機能亢進を認めた。 体動困難もあり報告施設へ搬送。甲状腺クリーゼの診断で、本剤投与開始。ランジオロール塩酸塩、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液、ヨウ化カリウムも投与開始。 投与7日後（投与中止日）　午前 心窩部痛出現。単純CT施行するも有意な所見なし。 午後 嘔気、下痢出現し、疼痛は腹部全体に拡大。 疼痛に対してアセトアミノフェン、ボノプラザンフマル酸塩を開始。 本剤投与中止。 中止1日後　症状改善なく、造影CT施行。膵臓周囲の脂肪織濃度上昇を認めた。アミラーゼ、P型アミラーゼが上昇しており、急性膵炎と診断。胆石、アルコール摂取、IgG4 関連による膵炎は否定的であり、薬剤性と考えられた。絶食・補液加療を開始。 中止3日後　急性膵炎は回復。

臨床検査値

検査項目（単位）	投与開始日	中止 1 日後	中止 3 日後	中止 4 日後	中止 5 日後
アミラーゼ（U/L）	30	155	46	25	39
P 型アミラーゼ（U/L）	－	136	35	16	22
リパーゼ（U/L）	－	182	－	－	26

併用薬：ランジオロール塩酸塩、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム、ヨウ化カリウム

＜メルカゾール錠5mg投与症例＞

No.	患　者		1日投与量 投与期間	副作用 経過及び処置
	性・ 年齢	使用理由 （合併症）		
2	女 70代	甲状腺中毒症、バセドウ病 （高血圧症、シェーグレン症候群、骨粗鬆症、心房細動、心不全）	15mg 16日間	**急性膵炎** 投与開始日　以前より、体重減少、動悸あり。 動悸、疲労感のため受診。心不全、心房細動が判明。バセドウ病の診断にて入院。 本剤及びヨウ化カリウム投与開始。 投与12日目　38.3℃の発熱と急性腹痛、下痢が発現。 CRPがやや高値を示した以外は特記すべき所見なし。腹部単純CTにて憩室炎が疑われ、セフメタゾール投与するも改善せず。 投与16日目（投与中止日）　膵酵素が上昇し、急性膵炎と診断。 本剤投与中止。ヨウ化カリウム増量。 補液、ウリナスタチン、イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムを投与開始。 中止8日後　腹痛、発熱は改善傾向。イミペネム水和物・シラスタチンナトリウムを中止し、ウリナスタチンをカモスタットメシル酸塩に変更。 甲状腺ホルモン上昇のため、プロピルチオウラシル投与開始し、ヨウ化カリウムを減量。その後、増悪なし。 中止16日後　全身状態改善したため退院。

臨床検査値

検査項目（単位）	投与 開始日	投与 12日目	投与16日目 (投与中止日)	投与中止 1日後	投与中止 8日後	投与中止 15日後	投与中止 25日後
アミラーゼ（IU/L）	56	76	214	336	134	195	120
リパーゼ（IU/L）	－	－	923	1519	269	－	214
エラスターゼ 1（ng/dL）	－	－	1537	3133	1703	－	1050
CRP（mg/dL）	－	0.98	9.97	13.06	0.61	0.05	0.06

併用薬：メトプロロール酒石酸塩、オルメサルタン　メドキソミル、ニフェジピン、リセドロン酸ナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物、ビソプロロールフマル酸塩、トラセミド、アピキサバン、トルバプタン、ジゴキシン、ヨウ化カリウム

以上